



**Stéphane PESTEL**  
02 40 09 59 22 | contact@spn-agrobio.fr  
06 22 11 85 36  
ZI de la Ferté | 5 Rue de Rome  
44370 VARADES  
[www.spn-agrobio.fr](http://www.spn-agrobio.fr)

# INSECTES ET MALADIES DU POTAGER

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007

Les éléments naturels présents dans cette préparation « INSECTES ET MALADIES DU POTAGER » aident la plante à faire face aux agressions extérieures.  
Cette préparation est utilisable sur les légumes du jardin.  
Une fois diluée, elle s'utilise en pulvérisation foliaire directement sur les ravageurs et maladies du potager.

**Usage :** Purin d'ortie (*Urtica dioica*) Insecticide fongicide acaricide  
**CAS N° 84012-40-8**

**Composition :** Substance de base autorisée selon le règlement européen CE 1107-/2009 conforme aux normes substance de base.

**Spécifications :** 15 grammes / litre de feuilles d'ortie séchées obtenues par macération et filtration dans de l'eau de pluie.

**Période d'emploi :**

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Période Optimum	Période Déconseillée
--------------------	-------------------------

**Dose d'emploi :** Méthode d'application par pulvérisation foliaire.

CULTURE	RAVAGEURS ET MALADIES CIBLÉES	PÉRIODE D'EMPLOI	APPLICATION	DOSE D'EMPLOI ml / litre d'eau
Haricots	Pucerons Araignée rouge (acariens)	Printemps/Été jusqu'à maturité pour cueillette	1 à 5 applications à intervalle de 7 à 21 jours	30 à 50
Pomme de terre	Pucerons Phytophthora	Printemps/Été jusqu'à la formation du tubercule		
Laitues (salades)	Pucerons	Printemps/Été jusqu'à 9 feuilles		
Choux	Pucerons Altises Alternariose	Printemps/Été jusqu'à 9 feuilles		
Radis	Teigne des crucifères Alternariose	Printemps/Été jusqu'à maturité		
Concombre	Alternariose Oïdium	Printemps/Été jusqu'à maturité		

**Précautions d'emploi :**

Respecter les doses d'emploi. Eviter le contact avec la peau et les yeux (port de lunettes). Se laver les mains après usage. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. Tenir à des températures comprises entre +5°C et + 25°C, hors de portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux.

Eliminer le contenant conformément aux consignes de tri.

