



Stéphane PESTEL
02 40 09 59 22 | contact@spn-agrobio.fr
06 22 11 85 36
ZI de la Ferté | 5 Rue de Rome
44370 VARADES
www.spn-agrobio.fr

PURIN D'ORTIE

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007

Le purin d'ortie est une spécialité issue de la macération de feuilles d'orties séchées. Cette préparation d'origine naturelle est utilisable au potager, sur les arbustes d'ornements, sur les fleurs du jardin ainsi que sur les arbres fruitiers.

Les éléments naturels présents dans l'ortie aident la plante à faire face aux agressions extérieures.

Une fois diluée, le purin d'ortie s'utilise en pulvérisation foliaire directement sur les ravageurs et maladies.

Usage : Purin d'ortie (*Urtica dioica*) Insecticide, fongicide et acaricide
CAS N° 84012-40-8

Composition :

Substance de base autorisée selon le règlement européen **CE 1107-/2009** conforme aux normes substance de base.

15 grammes / litre de feuilles d'ortie séchées obtenues par macération et filtration dans de l'eau de pluie.

Période d'emploi :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Période Optimum	Période Déconseillée
--------------------	-------------------------

Dose d'emploi : Méthode d'application par pulvérisation foliaire

CULTURE	RAVAGEURS ET MALADIES CIBLÉES	PÉRIODE D'EMPLOI	APPLICATION	DOSE D'EMPLOI ml / litre d'eau
Pommier Prunier Pêcher Groseillier Noyer Cerisier	Pucerons Pucerons Pucerons lanigères Pucerons Pucerons Pucerons	Printemps/Eté jusqu'à maturité des fruits pour cueillette	1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours	30 à 90
Haricots	Pucerons	Printemps/Eté jusqu'à maturité pour cueillette		30 à 50
Pomme de terre		Printemps/Eté jusqu'à la formation du tubercule		30 à 50
Laitues (salades) Choux		Printemps/Eté jusqu'à 9 feuilles		30 à 50
Rosier		Printemps/Eté		30 à 60
Spirée				
Choux	Altises	Printemps/Eté jusqu'à 9 feuilles	1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours	30 à 50
Colza Radis	Teigne des crucifères	Printemps/Eté jusqu'à maturité		
Pommier Poirier	Carpocapse	2 traitements en avril et 1 traitement en mai	Application tous les 15 jours	30 à 90
Haricots	Araignée rouge (acariens)	Printemps/Eté jusqu'à maturité	1 à 6 traitements Application tous les 7 à 21 jours	30 à 50
Vignes	Araignée rouge (acariens)	Printemps/Eté	1 à 6 traitements 3 avant floraison et 3 après floraison	30 à 60
Choux Radis	Alternariose	Printemps/Eté jusqu'à maturité	1 à 6 traitements Application de 7 à 15 jours	30 à 50
Concombre	Alternariose et oidium	Printemps/Eté jusqu'à maturité	1 à 6 traitements Application de 7 à 15 jours	30 à 50
Pommier Prunier Pêcher Cerisier	Alternariose, moniliose, botrytis, rhizopus stolonifer (pourritures)	Printemps/Eté jusqu'à maturité pour cueillette	1 à 6 traitements Application de 7 à 15 jours	30 à 90
Vignes	Mildiou	Printemps/Eté	1 à 6 traitements Application de 7 à 15 jours	30 à 60
Pommes de terre	Phytophthora	Printemps/Eté jusqu'à la formation des tubercules	1 à 6 traitements Application de 7 à 15 jours	30 à 50

Précautions d'emploi :

Respecter les doses d'emploi. Eviter le contact avec la peau et les yeux (port de lunettes). Se laver les mains après usage. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. Tenir à des températures comprises entre +5°C et + 25°C, hors de portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux.

Eliminer le contenant conformément aux consignes de tri.

